

ÖZET

Tüm kombinasyonlarda tam çiçeklenmeler Mart ayı içerisinde gerçekleşmiştir. 2005 yılında çöğür/Papaz, GF 8-1/Santa Rosa, Common Mussel/Santa Rosa ve Common Mussel/Ozark Premier kombinasyonları; 2006 yılında da Common Mussel/Papaz, Pixy/Papaz, GF 31/Santa Rosa ve Common Mussel/Ozark Premier kombinasyonları diğer kombinasyonlardan daha önce hasat edilmiştir.

Meyve ağırlığı “Papaz” çeşidi kombinasyonlarda GF 31, “Santa Rosa” çeşidi kombinasyonlarda, “Ozark Premier” için ise GF 8-1 ve çöğür üzerine aşılı kombinasyonlarda daha fazladır. Denemede elde edilen ağaç başına verimler tozlanma, dölleme sorunları ve toprak koşullarından dolayı fazla olmamıştır. “Papaz” çeşidi ilk deneme yılında tozlayıcı sorunu sebebiyle çok az meyve vermiştir. 2006 yılında ise; en fazla meyve GF 8-1, “Santa Rosa” kombinasyonları için 2005 yılında C. Mussel, 2006 yılında ise; Myrobolan B, “Ozark Premier” çeşidinde ise; 2005 yılı ve 2006 yılında GF 8-1 anacına aşılı kombinasyonda olmuştur.

Gövde kesit alanına düşen ortalama verim bakımından; 2. yılda çöğür üzerine aşılı “Papaz” çeşidi en fazla değere sahip kombinasyondur. “Santa Rosa” çeşidine ait kombinasyonlardan 2005 yılında, C. Mussel, 2. yılda ise; Myrobolan B, “Ozark Premier” çeşidi için de; GF 8-1 anacı, 2005 ve 2006 yılında en fazla değere ulaşan kombinasyonlardır. Taç alanına düşen ortalama verim bakımından ise; sırasıyla yıllara göre “Papaz” çeşidi için; Pixy ve çöğür; “Santa Rosa” ve “Ozark Premier” çeşidi için C. Mussel ve Myrobolan B en fazla değerlere sahiptir.